



Post Test

Nombre _____

CI del Taller: _____

1. Cuando se acomoda la mandíbula:
 - Se quita cuerpos extraños de la boca
 - Se quita la lengua de la garganta
 - Se estimula al paciente para respirar cuando esta inconsciente
 - No se estabiliza la columna cervical

2. Cuando existen un objeto empalado (incrustados), usted debe:
 - Echar agua y mantenerlo húmedo
 - Retirarlo lo mas rápido posible
 - Cortar la parte protuberante del objeto
 - Proteger el objeto y estabilizarlo utilizando vendajes abultados alrededor.

3. Usted fue testigo de un choque con un automóvil y un transeúnte. Usted debe:
 - Llamar a la policía y retirarse de la escena.
 - Ayudar a pesar de lo que la victima quiera
 - Perseguir el automóvil para dar parte a la policía
 - Detenerse y evaluar a la victima para ofrecer ayuda

4. Cuando se aproxima a la escena del accidente, el primer paso debe ser:
 - Acercarse a la victima
 - Asegurarse que la escena es segura para usted y los demás
 - Priorizar las victimas
 - Continuar conduciendo con cuidado

5. Un paciente con una fractura pélvica puede perder más de:
 - ½ L de sangre
 - 1L de sangre
 - 5L de sangre
 - No mucha sangre porque la pelvis no tiene vasos sanguíneos

6. La manera mas segura para detener el sangrado es:
 - Echar agua limpia a la herida
 - Usar un torniquete
 - Elevar la herida y usar un torniquete
 - Aplicar presión directa y elevar la herida

7. Cuando existe fluidos corporales, usted debe
 - Echar vinagre en el área de su cuerpo que esta en contacto con los fluidos
 - Echar agua en el área para limpiar y usar una bolsa de plástico para proteger las manos
 - Usar material de algodón limpio para absorber los fluidos
 - Detener la ayuda, porque es muy peligroso

8. Cuando se usa un torniquete para detener el sangrado, usted debe:
 - Asegurarse que este muy apretó para que quite toda la circulación de la sangre en la extremidad
 - Mantener el área del sangrado cubierto
 - Anotar el tiempo de aplicación en la frente de la victima
 - Nunca utilice un torniquete para controlar el sangrado

9. Cual es la mejor posición para trasladar a un paciente inconsciente que no presenta traumatismo?
 - Echarlo de costado



Post Test

Nombre _____

CI del Taller: _____

- Echarlo sobre su espalda
- Echarlo sobre su abdomen
- Sentarlo recto

10. Cual de los siguientes lugares puede ser un área de hemorragia invisible que puede bajar su presión arterial?

- Antebrazo
- Muslo
- Cabeza
- Pie

11. Cuando usted pregunta el nombre del paciente, y él responde apropiadamente, usted sabe:

- Que la circulación hasta el cerebro del paciente es suficiente
- Que el paciente está respirando
- Que la vía aérea está abierta
- Todo lo anterior

12. Cuando evalúa a un paciente lesionado, cual es el primer paso que debería realizar?

- Mover el paciente al vehículo
- Evaluar si está sangrando
- Evaluar si existen señales de lesiones
- Evaluar si está respirando

13. Para el paciente inconsciente, la prioridad principal es:

- Limpiar la boca con dos dedos para revisar si hay algún objeto
- Abrir la boca levantando la barbilla o acomodando la mandibular
- Mantener caliente con una cobija
- Comenzar a RCP inmediatamente

14. En un paciente quemado, durante el traslado:

- Deben reventarse las ampollas lo mas rápido posible
- Las quemaduras totales (3^{er} grado) son dolorosas y húmedas
- Las quemaduras severas deben ser tratadas con ungüentos o cremas
- Las ampollas indican quemaduras de 2^{do} grado

15. En una emergencia cuando se traslada a una persona a un centro de salud, es importante conducir lo mas rápido posible porque habrá diferencia porque la vida del paciente corre riesgo.

- Verdadero
- Falso

16. La "zona de seguridad" alrededor de la escena en caso de derrame de material peligroso debe estar por lo menos a:

- 3 metros
- 6 metros
- 15 metros
- 30 metros

17. En caso de victimas múltiples, usted debe priorizar la evaluación de la persona que:

- Está gritando por ayuda
- No esta respirando y se esta poniendo azul
- Tiene la pierna fracturada y está sangrando



Post Test

Nombre _____

CI del Taller: _____

- No tiene respiración ni pulso

18. En un colisión de vehículos motorizados, el órgano más frecuentemente lesionado es:

- Los intestinos
- El hígado
- La páncreas
- El bazo

19. Ferulizar la extremidad fracturado es importante porque:

- Alivia el dolor
- Limita la perdida de sangre
- Facilita el traslado
- Todo lo anterior

20. En la escena del accidente, debe realizar RCP y retrasar el traslado hasta que recupere el pulso.

- Verdadero
- Falso

21. Cual de las siguientes afirmaciones representa una señal tardía de shock?

- Confusión
- Presión alta
- Enrojecimiento del paciente
- Disminución de la frecuencia cardíaca

22. A que paciente atendería primero en la escena de un accidente:

- A un joven de 25 años que se está gimiendo
- A un niño de 7 años que está echado y no está respondiendo
- A una mujer de 35 años que está sangrando de una pierna amputada
- A un joven de 20 años que está gritando porque le duela su pierna

23. Cuando usted ve un hueso expuesto, debe:

- Poner el hueso en su lugar
- Aplicar un torniquete en la parte superior de la fractura
- Cubrir con un paño limpio y húmedo
- Reducir la fractura halando en la extremidad

24. La férula debe:

- Proveer apoyo solo en el área de la lesión
- Ser apretado tan fuerte como sea posible
- Debe ser lo suficientemente larga para inmovilizar las articulaciones anteriores y posteriores de la lesión
- No se debe utilizar la férula porque puede empeorar la lesión

25. En caso de una escena de victimas múltiples , usted debe pedir:

- A los que no pueden moverse que esperen hasta que llegue ayuda
- Que no se acerquen a la escena hasta que la ayuda llegue
- A aquellos que pueden caminar para retirarse de la escena
- Que las victimas se dividan en grupos de 4 para facilitar el traslado